Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
EDITAL Nº 1 - COREMU/UFPA, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015

**PROCESSO SELETIVO DE
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2016
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA
PROFISSIONAL CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA
DE ANIMAIS SILVESTRES**

Medicina Veterinária

17 de janeiro de 2016

Nome do Candidato: _____

Nº de Inscrição: _____

Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde a especialidade a qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala.
2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das respostas das questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo 15 do SUS e 35 de Área Específica. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. **Esta prova terá duração de quatro horas, tendo seu início às 8:00 hs e término às 12:00 hs (horário de Belém-PA).**
4. Cada questão objetiva apresenta 5 (cinco) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E). Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 50.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, especialidade e data de nascimento, consta na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre no formulário de Correção de Dados a devida correção.
6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, duas horas após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação.
8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não será considerado.
9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão.
10. O BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA serão devolvidos ao final da sua prova. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
11. Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo de Residência Multiprofissional o candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 01/COREMU/2015 do referido processo.

Boa Prova.

FADESP

SUS

1. O trabalho dos gestores das três esferas de governo e dos outros atores envolvidos no Pacto em Defesa do SUS deve considerar como diretriz
 - (A) estabelecimento do diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS.
 - (B) promoção da cidadania como estratégia de mobilização social, tendo a questão da saúde como um direito.
 - (C) repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira, aproximando-a dos desafios atuais do SUS.
 - (D) articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como um direito.
 - (E) desenvolver e articular ações, no seu âmbito de competência e em conjunto com os demais gestores, que visem qualificar e assegurar o Sistema Único de Saúde como política pública.

2. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, institui
 - (A) são estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar, somente, para crianças e idosos.
 - (B) o impedimento de destinação de recursos públicos para auxílios nos tratamentos de portadores de doenças crônicas.
 - (C) estabelece os direitos e deveres dos usuários em relação ao atendimento nos Programas de Saúde da Família.
 - (D) esta lei regula, somente nos municípios, as ações e os serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
 - (E) as ações e os serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente seja mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

3. A regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do pacto de Gestão. Quanto aos objetivos da Regionalização pode-se afirmar que garante o(a)
 - (A) acesso somente aos serviços de saúde de média complexidade no município.
 - (B) direito à saúde, somente a nível local, que possibilite a redução das desigualdades no acesso às ações e aos serviços de saúde existentes no município.
 - (C) acesso, resolutividade e qualidade às ações e aos serviços de saúde cuja complexidade e contingente populacional transcenda a escala local/municipal.
 - (D) integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de acesso nos níveis de baixa e média complexidade do sistema.
 - (E) integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de acesso no nível de alta complexidade do sistema.

RASCUNHO

- 4.** Com relação à Regulação da Atenção à Saúde e Regulação Assistencial, pode-se afirmar que
- (A)** a Regulação da Atenção à Saúde tem como objeto a produção de todas as ações diretas e finais da atenção à saúde, dirigida aos prestadores de serviços de saúde públicos.
 - (B)** a Regulação da Atenção à Saúde tem como objeto a produção de todas as ações diretas e finais da atenção à saúde, dirigida aos prestadores de serviços de saúde privados.
 - (C)** a Regulação da Atenção à Saúde tem como objeto a produção de todas as ações diretas e finais da atenção à saúde, dirigida aos prestadores de serviços de saúde públicos e privados.
 - (D)** os complexos reguladores podem ter abrangência inframunicipal, municipal, micro ou macro regional, estadual ou nacional, devendo esta abrangência e sua respectiva gestão serem pactuadas em processo democrático e solidário entre as duas esferas de gestão do SUS.
 - (E)** os complexos reguladores podem ter abrangência inframunicipal, municipal, micro ou macro regional, estadual ou nacional, devendo esta abrangência e sua respectiva gestão serem pactuadas em processo democrático e solidário, na esfera estadual de gestão do SUS.
- 5.** Os municípios têm como responsabilidade, na Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria,
- (A)** coordenar, no âmbito nacional, a estratégia de identificação dos usuários do SUS.
 - (B)** realizar a identificação dos usuários do SUS, com vistas à vinculação de clientela e à sistematização da oferta de serviços.
 - (C)** adotar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, em consonância com os protocolos e diretrizes municipais.
 - (D)** monitorar e avaliar as ações de vigilância em saúde, realizadas nos estados, por intermédio de indicadores de desempenho, envolvendo aspectos epidemiológicos e operacionais.
 - (E)** manter atualizado o Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde no seu território, segundo normas da Secretaria de Saúde do Estado.
- 6.** Sobre as diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS, é correto afirmar que a(s)
- (A)** União é quem determina as necessidades de manutenção e expansão dos quadros de trabalhadores da saúde para os estados e municípios.
 - (B)** Secretarias de Saúdes Estaduais devem formular diretrizes de cooperação técnica para a gestão do trabalho no SUS.
 - (C)** duas esferas de gestão devem propor estudos quanto às estratégias e ao financiamento para os trabalhadores do SUS.
 - (D)** política de recursos humanos para o SUS é um eixo estruturante e deve buscar a valorização do trabalho e dos trabalhadores da saúde, o tratamento dos conflitos e a humanização das relações de trabalho.
 - (E)** políticas de recursos humanos para a Atenção Básica de Saúde são de responsabilidade, única e exclusivamente, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS.
- 7.** Quanto à educação na saúde, é responsabilidade do município
- (A)** incentivar junto à rede de ensino, no âmbito estadual, a realização de ações educativas e de conhecimento do SUS.
 - (B)** incentivar junto à rede de ensino, no âmbito municipal, estadual e nacional, a realização de ações educativas e de conhecimento do SUS.
 - (C)** propor e pactuar, com o Sistema Federal de Educação, processos de formação de acordo com as necessidades do SUS, articulando os demais gestores na mesma direção.
 - (D)** promover a integração de todos os processos de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos à política de educação permanente, no âmbito da gestão estadual do SUS.
 - (E)** apoiar e promover a aproximação dos movimentos de educação popular na saúde na formação dos profissionais de saúde, em consonância com as necessidades sociais em saúde.

8. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, publicada no DOU de 20/09/1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. No Art. 18, estão estabelecidas as competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS entre elas
- (A) formar consórcios administrativos intermunicipais.
 - (B) formar consórcios administrativos interestaduais.
 - (C) formar consórcios administrativos intermunicipais e interestaduais.
 - (D) dar execução, no âmbito estadual, à política de insumos e equipamentos para a saúde.
 - (E) controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços municipais, estaduais e federais de saúde.
9. Está correto afirmar que
- (A) a organização da Região de Saúde deve favorecer a ação cooperativa e solidária entre os gestores e o fortalecimento do controle social.
 - (B) o Plano Diretor de Investimento – PDI, expressa os recursos de investimentos para atender às necessidades pactuadas no planejamento nacional.
 - (C) o Plano Diretor de Regionalização – PDR, expressa o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em suas diferentes formas, em cada município.
 - (D) entre as premissas da descentralização, podemos dizer que, a Comissão Intergestores Bipartite e o Ministério da Saúde promoverão a apoiarão o processo de qualificação permanente para as Comissões Intergestores Tripartite.
 - (E) os principais instrumentos de planejamento da regionalização são o Plano Diretor de Regionalização – PDR, o Plano Diretor de Investimento – PDI, a Programação Pactuada e Integrada da Atenção à Saúde – PPI, o Piso de Atenção Básica – PAB e o Piso de Atenção Básica Variável – PAB Variável.
10. Entre os objetivos do fortalecimento da Atenção Básica está
- (A) garantir o financiamento da atenção básica como responsabilidade das duas esferas de gestão do SUS.
 - (B) ampliar a estratégia de Saúde da Família, e os serviços de média e alta complexidade nos grandes centros urbanos.
 - (C) garantir o financiamento da atenção básica como responsabilidade das três esferas de gestão do SUS.
 - (D) consolidar e qualificar a estratégia de Saúde da Família, somente, nos pequenos municípios.
 - (E) implantar o processo de monitoramento e avaliação da atenção básica nas duas esferas de governo, com vistas à qualificação da gestão descentralizada.
11. A lei 8080/90, no Art. 13, determina a articulação das políticas e dos programas, a cargos das comissões intersetoriais, abrangendo, em especial, as seguintes atividades:
- (A) alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; vigilância sanitária e farmacoepidemiológica; recursos humanos; ciência e tecnologia e saúde do trabalhador.
 - (B) alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; vigilância sanitária e farmacoepidemiológica; recursos humanos; ciência e tecnologia; saúde do trabalhador e saúde indígena.
 - (C) alimentação e nutrição; vigilância sanitária e farmacoepidemiológica; recursos humanos; ciência e tecnologia; saúde do trabalhador e saúde indígena.
 - (D) alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; vigilância sanitária e farmacoepidemiológica; ciência e tecnologia; saúde do trabalhador e saúde indígena.
 - (E) alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; vigilância epidemiológica; ciência e tecnologia; saúde do trabalhador e saúde indígena.

RASCUNHO

- 12.** A lei 8142/90 refere em seu Art. 2º que os recursos do Fundo Nacional de Saúde – FNS serão alocados como
- (A) cobertura das ações e dos serviços de saúde a serem implementados pela União.
 - (B) investimentos previstos no Plano Quinquenal dos Ministérios da Saúde e da Educação.
 - (C) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional.
 - (D) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
 - (E) despesas de custeio e de capital dos Ministérios da Saúde e da Educação, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- 13.** Em relação à direção e articulação do SUS, é correto afirmar que a(o)
- (A) direção do SUS, em cada esfera de governo, é composta pelo órgão setorial do poder executivo e pelo respectivo Conselho de Saúde, nos termos das Leis Nº 8.080/90 e Nº 8.112/1990.
 - (B) definição sobre o número de membros de cada CIT deve considerar as diferentes situações de cada estado, como número de municípios, número de regiões de saúde, buscando a maior representatividade possível.
 - (C) processo de articulação entre os gestores, nos diferentes níveis do sistema, ocorre, preferencialmente, em dois colegiados de negociação: a Comissão Intergestores Tripartite - CIT e a Comissão Intergestores Bipartite - CIB, que pactuarão sobre a organização, direção e gestão da saúde.
 - (D) CIB é composta, paritariamente, por representação do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde CONASS e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde CONASEMS, sendo um espaço tripartite para a elaboração de propostas para a implantação e operacionalização do SUS.
 - (E) CIT, composta igualmente de forma paritária e integrada por representação da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde COSEMS ou órgão equivalente, é a instância privilegiada de negociação e decisão quanto aos aspectos operacionais do SUS.
- 14.** O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Entre as suas prioridades, foi pactuada a Promoção da Saúde, que tem como um dos seus objetivos elaborar e implementar uma política de promoção da saúde, de responsabilidade do(s) gestor(es)
- (A) municipal.
 - (B) municipal estadual e federal.
 - (C) municipal e estadual.
 - (D) estadual e federal.
 - (E) municipal e federal.
- 15.** A Participação Social no SUS é um princípio doutrinário assegurado na Constituição e nas Leis Orgânicas da Saúde (8080/90 e 8142/90) e é parte fundamental do Pacto pela Vida. Uma das ações que deve ser desenvolvida para fortalecer o processo de participação social é
- (A) apoiar o processo de formação dos conselheiros.
 - (B) apoiar o processo de formação dos conselheiros e dos secretários municipais e estaduais de saúde.
 - (C) estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde, educação e segurança nos municípios.
 - (D) apoiar os processos de educação popular e permanente na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
 - (E) apoiar os conselhos de saúde, as conferências de saúde e os movimentos sociais que atuam no campo da saúde e educação.

ÁREA ESPECÍFICA

16. É/são estratégia(s) de conservação *ex situ* de animais silvestres (atividades desenvolvidas fora do habitat natural)

- (A) desenvolvimento de técnicas de criação, manejo em cativeiro e de tecnologias de reprodução de animais silvestres.
- (B) translocação de animais silvestres.
- (C) estabelecimento de áreas protegidas, como parques e reservas.
- (D) monitoramento de fauna em ambientes naturais.
- (E) monitoramento do uso de fauna em reservas de desenvolvimento sustentável.

17. No estabelecimento de um programa de reprodução em cativeiro de um animal silvestre, a sexagem é imprescindível para a escolha de matrizes. Sobre a sexagem em répteis é correto afirmar que

- (A) em serpentes, somente é possível por meio de técnicas de biologia molecular.
- (B) as fêmeas de squamata possuem o plastrão convexo.
- (C) os machos de iguana possuem glândulas femurais evidentes.
- (D) nos crocódilianos, os machos possuem um par de hemipênis.
- (E) em testudinatas, os machos adultos possuem o plastrão côncavo.

18. A identificação individual de animais silvestres é essencial para o manejo em cativeiro e para o monitoramento a campo. Acerca dos métodos de identificação de animais silvestres, correlacione as duas colunas e assinale a alternativa correta em relação ao método e à espécie.

I	Lacre.	()	<i>Sapajusapella</i> , aplicação subcutânea no dorso do animal.
II	Microchip.	()	<i>Caimanyacare</i> , aplicação na cauda.
III	Brinco.	()	<i>Mazamagouazoubira</i> , aplicação na orelha.
IV	Anilha.	()	<i>Nasuanasua</i> , face interna da coxa.
V	Tatuagem.	()	<i>Heterospiziasmeridionalis</i> , porção distal do membro pélvico.

A sequência correta é

- (A) II, I, III, V, IV.
- (B) I, II, III, IV, V.
- (C) IV, V, III, II, I.
- (D) III, I, V, II, IV.
- (E) II, IV, III, V, I.

19. As penas são uma característica distintiva e exclusiva das aves. Sobre as penas considere as informações:

- I As áreas cobertas e descobertas de penas são denominadas de pterilas e aptérias, respectivamente.
- II Deficiências nutricionais, estresse ou cortisona exógena podem causar o aparecimento de linhas horizontais de falha na pena emergente.
- III Uma pena no estágio inicial do processo de muda que é danificada pode sangrar profusamente.
- IV As penas de voo são longas e resistentes, sendo que as da cauda são chamadas de retrizes e as da asa, rêmiges.
- V Tetrizes são pequenas penas que cobrem o corpo da ave.

Estão corretos os itens

- (A) I, III e V.
- (B) II, IV e V.
- (C) I, III e IV.
- (D) I, II e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

20. Acerca do sistema digestivo de aves, analise as afirmativas:

- I A ranfoteca cobre as partes rostrais dos ossos mandibulares, ou seja, a maxila e a mandíbula.
- II As aves possuem o palato mole fendido.
- III O esôfago desce pelo lado direito do pescoço, oposto de sua posição anatômica em mamíferos.
- IV O inglúvio é uma dilatação do esôfago onde o alimento é estocado e amolecido com muco.
- V O proventrículo é o estômago mecânico e o ventrículo é o glandular.

Estão corretos os itens

- (A) II, III e V.
- (B) I, IV e V.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) I, II, III, IV e V.

21. De acordo com o hábito alimentar, as aves possuem várias adaptações anatômicas do sistema digestivo. Sobre a anatomia comparativa do sistema digestivo de aves, considere as informações abaixo relacionadas.

- I Os psitacídeos possuem um inglúvio bem desenvolvido, proventrículo e ventrículo, mas não tem ceco.
- II Os passeriformes que se alimentam de sementes possuem inglúvio e ventrículo forte, e os cecos, quando presentes, são vestigiais e não participam da digestão.
- III Os strigiformes possuem inglúvio.
- IV Os falconiformes possuem um ceco vestigial.
- V Os strigiformes possuem o ceco grande e funcional.

Estão corretos os itens

- (A) I, III e V.
- (B) II, IV e V.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I, II, IV e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

22. A regurgitação em aves acontece quando um alimento é devolvido do inglúvio. Um papagaio filhote foi atendido no hospital veterinário sob a queixa de regurgitação, além de apatia, anorexia e penas arrepiadas. Ao exame físico, foi detectada a presença de lesões membranosas de coloração branca e caseosa, exudato catarral na cavidade orofaríngea, estase e presença de gás no inglúvio. Tais manifestações clínicas correspondem a

- (A) aspergilose.
- (B) hipovitaminose A.
- (C) tricomoníase.
- (D) candidíase.
- (E) capilaríase.

23. A associação entre a espécie de animal silvestre e o método de contenção física está correta em

- (A) *Nasuanasua* – capuz.
- (B) *Saguinusmidas* – rede de neblina.
- (C) *Boa constrictor* – tubo plástico.
- (D) *Sapajusapella* – laço de lutz.
- (E) *Pulsatrixperspicillata* – puçá.

24. Vários aspectos importantes da saúde das aves silvestres podem ser avaliados pela inspeção dos excrementos. As aves produzem um excremento formado por resíduos combinados dos intestinos (fezes) e dos rins (uratos e urina). Julgue os itens abaixo.

- I A presença de alimentos não digeridos é uma condição normal.
- II Os uratos são normalmente da cor branca ou creme, mas também podem absorver pigmentos dos itens alimentares.
- III Ausência total de uratos pode indicar doença renal ou hepática.
- IV A urina líquida aumentada de volume é indicativa de poliúria.
- V A presença de uratos verdes brilhantes não deve suscitar a necessidade de exames adicionais.

Estão corretos os itens

- (A) I, III e V.
- (B) II, IV e V.
- (C) II, III e IV.
- (D) I, IV e V.
- (E) I e V.

25. Acerca das deficiências nutricionais de animais silvestres, analise as assertivas abaixo.

- I Deficiências nutricionais de cálcio e vitamina D3 podem provocar retenção de ovos e osteoporose em aves em reprodução, e osteodistrofia em aves em crescimento.
- II O prurido é um sinal clínico sugestivo de doença óssea-metabólica em répteis.
- III A doença do músculo-branco é uma desordem metabólica que ocorre em répteis herbívoros por hipoavitaminose E, que pode estar associada com a deficiência de selênio.
- IV A hipoavitaminose C não é uma condição descrita em répteis, uma vez que esses animais produzem essa vitamina em quantidades adequadas nos rins.
- V O blefaredema é um sinal clínico relacionado à hipoavitaminose A em quelônios.

Estão corretas as assertivas

- (A) todas estão corretas.
- (B) II, III e V.
- (C) I, II e IV.
- (D) I, III e V.
- (E) I, II e IV.

26. A hospitalização de um animal silvestre é um grande desafio, uma vez que a manutenção em cativeiro exige capacidade de adaptação ao ambiente hospitalar, o que pode causar estresse. No tocante às respostas fisiológicas ao estresse, analise as assertivas abaixo.

- I A síndrome geral de adaptação compreende um conjunto de respostas fisiológicas desencadeadas diante de um agente estressor.
- II No estresse agudo, predomina a resposta do sistema nervoso autônomo parassimpático, resultando na liberação de catecolaminas como a epinefrina e a norepinefrina.
- III A ação do sistema nervoso autônomo simpático tem como consequência a ativação extra do organismo em situações de estresse, que possibilita ações rápidas por parte dos animais, o que é conhecido como fases de alarme.
- IV Ao fim da fase de alarme, o equilíbrio é restabelecido pela ação do sistema nervoso autônomo simpático, com diminuição da frequência cardíaca e respiratória e aumento do peristaltismo gastrointestinal e urinário.
- V A manutenção da situação de estresse pode levar o animal à adaptação, que se caracteriza por aumento da liberação de glicocorticóides pela glândula adrenal.

Estão corretas as assertivas

- (A) I, II e IV.
- (B) II, III e V.
- (C) I, II e V.
- (D) I, II e III.
- (E) I, III e V.

27. As preguiças são animais herbívoros e arborícolas que comumente são atendidos em hospitais veterinários em decorrência de várias situações típicas da ação antrópica em seus habitats. Quanto à alimentação desses animais, é correto afirmar que

- (A) todas as espécies de preguiças têm preferência por folhas maduras.
- (B) o gênero *Bradypus* é onívoro.
- (C) o gênero *Choloepus* é estritamente frugívoro.
- (D) os gêneros *Bradypus* e *Choloepus* são exclusivamente folívoros.
- (E) o gênero *Bradypus* é folívoro, embora possa ingerir brotos, flores e frutos imaturos.

28. A fluidoterapia pode ser fundamental para o paciente aviário crítico. Fluidos parenterais irão restaurar o volume sanguíneo efetivo, normalizar o débito cardíaco e otimizar a oxigenação nos tecidos. Acerca da fluidoterapia em aves, é correto afirmar que

- (A) é benéfica por diminuir a diurese.
- (B) em pacientes críticos, as vias oral e subcutânea são as indicadas.
- (C) para o paciente em choque, as vias intravenosa e intraóssea são as de eleição.
- (D) em caso de anemia e hipoproteïnemia, a fluidoterapia deve ser agressiva.
- (E) o Ringer-lactato não deve ser empregado em casos de acidose metabólica.

29. Quando hospitalizadas, as aves silvestres devem ser monitoradas por exames laboratoriais para avaliação do progresso ou a melhora do paciente. Acerca de tais procedimentos, analise as assertivas abaixo.

- I Para a coleta de amostras de sangue, utiliza-se seringa heparinizada.
- II Amostras de sangue de 0,5% do peso corpóreo podem ser obtidas com segurança.
- III A contagem relativa dos glóbulos brancos não tem valor clínico.
- IV O monitoramento da matéria fecal do paciente pode auxiliar na avaliação da resposta do tratamento.
- V A citologia das fezes é importante no acompanhamento de lesões e condições bacteriológicas dos intestinos, principalmente nas espécies que não possuem ceco funcional como os psitacídeos e passeriformes.

Estão corretas as assertivas

- (A) II, III e IV.
- (B) I, II, IV e V.
- (C) I, II e IV.
- (D) II, III, IV e V.
- (E) I, IV e V.

30. A pododermatite é uma condição inflamatória e degenerativa que pode atingir os pés das aves. Sobre a pododermatite, é correto afirmar que

- (A) pode ser resultante de feridas perfurantes autoinflingidas, penetração de corpos estranhos, poleiros inadequados, mordidas das presas ou outros traumas.
- (B) ocorre exclusivamente em aves de cativeiro.
- (C) as complicações da pododermatite não comprometem o estado geral da ave.
- (D) o tipo I caracteriza-se por lesões extensas, geralmente afetando ambos os membros da ave.
- (E) o tipo II é caracterizado por uma profunda infecção dos tecidos moles e osteomielite.

RASCUNHO

31. O êxito de uma terapia de emergência é dependente do manejo a longo prazo do paciente em recuperação. A anorexia parcial ou completa é um quadro clínico presente em muitas doenças e muitas vezes ocorre em um momento no qual o paciente necessita de maior aporte nutricional. Sobre a alimentação de aves convalescentes, considere as informações a seguir relacionadas.

- I O fornecimento de alimento em pequenas quantidades e em intervalos frequentes não é útil para o restabelecimento do apetite.
- II A oferta de alimentos aos quais o animal está habituado não deve ser preconizada.
- III Durante a alimentação por sonda, tentativas diárias devem ser conduzidas no intuito de ajudar o paciente a recuperar seus hábitos alimentares normais.
- IV Alimentos conhecidos pelo paciente podem ficar disponíveis *ad libitum*.
- V A formulação da dieta deve ter eficiência nutricional para manter ou aumentar o peso da ave durante o período de recuperação, respeitando-se a condição corpórea do paciente.

Estão corretas

- (A) I, III e V.
- (B) II, IV e V.
- (C) III, IV e V.
- (D) II, III e V.
- (E) I, II e III.

32. O suporte nutricional em aves é mais comumente empregado via alimentação por sonda. Uma contraindicação do emprego de sondas para alimentação de uma ave em recuperação é

- (A) inapetência.
- (B) deficiência nutricional.
- (C) estase de papo.
- (D) anorexia.
- (E) desidratação

33. Sobre a destinação dos animais silvestres apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente ao IBAMA, considere os itens abaixo.

- I Os espécimes da fauna silvestre serão objeto das modalidades de destinação imediata ou mediata.
- II A destinação mediata compreende: a) soltura experimental; b) revigoramento populacional; c) reintrodução; d) cativeiro; ou e) para fins de pesquisa, educação ou treinamento.
- III A soltura imediata não deve ser prioridade.
- IV Nos casos em que o espécime apresente indícios comportamentais de que foi recém-capturado, poderá ser realizada a soltura imediata.

Os itens que estão de acordo com as disposições expressas na Instrução Normativa ICMBIO nº 23, de 31 de dezembro de 2014, Capítulo II, Seção V, Art. 14º e Art. 15º, são

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) I, II e III.
- (D) I, III e IV.
- (E) I, II e IV.

RASCUNHO

34. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, por meio da Resolução nº 829 de 25 de abril de 2006, disciplina atendimento médico veterinário a animais silvestres/selvagens e dá outras providências. A respeito desse tema, avalie os itens a seguir:

- I Os animais silvestres/selvagens devem receber assistência médica veterinária desde que sejam oriundos de instituições credenciadas pelos órgãos ambientais.
- II Os animais silvestres/selvagens devem receber assistência médica veterinária independentemente de sua origem.
- III Quando do atendimento a animais silvestres/selvagens os médicos veterinários deverão elaborar prontuário contendo informações indispensáveis à identificação do animal e de seu detentor.
- IV Quando do atendimento a animais silvestres/selvagens os médicos veterinários deverão informar ao detentor a necessidade de legalização dos animais.

Estão de acordo com a referida Resolução os itens

- (A) I, III e IV.
- (B) II e III.
- (C) II e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) III e IV.

35. Considerando o disposto na Instrução Normativa ICMBIO nº 23, de 31 de dezembro de 2014, Capítulo I, Art. 2º, julgue os itens a seguir.

- I Animal silvestre: espécime da fauna nativa ou exótica cujas características genóticas e fenotípicas não foram alteradas pelo manejo humano, mantendo correlação com os indivíduos atual ou historicamente presentes em ambiente natural, independentemente da ocorrência e fixação de eventual mutação ou características fenotípicas artificialmente selecionadas, mas que não se fixe por gerações de forma a incorrer em isolamento reprodutivo com a espécie original.
- II Animal exótico: todo animal pertencente a espécie ou subespécie cuja distribuição geográfica original não inclui o território brasileiro ou as águas jurisdicionais brasileiras e as espécies ou subespécies introduzidas pelo homem, inclusive domésticas.
- III Animal silvestre da fauna nativa: todo animal pertencente a espécie nativa, migratória e qualquer outra não exótica, que tenha todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras.

Estão corretas as definições

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III.
- (D) I e III.
- (E) somente II.

36. Conforme Instrução Normativa IBAMA nº 169, de 20 de fevereiro de 2008, Capítulo I, Art. 3º, entende-se por Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)

- (A) todo empreendimento autorizado pelo Ibama, somente de pessoa jurídica, com finalidade de: receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, criar, recriar, reproduzir, manter e reabilitar espécimes da fauna silvestre nativa para fins de programas de reintrodução no ambiente natural.
- (B) todo empreendimento autorizado pelo Ibama, somente de pessoa jurídica, vinculada à instituição de pesquisa ou de ensino e pesquisa oficiais, com finalidade de: criar, recriar, reproduzir e manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro para fins de realizar e subsidiar pesquisas científicas, ensino e extensão.
- (C) todo empreendimento autorizado pelo Ibama, de pessoa física ou jurídica, com a finalidade de: criar, recriar, terminar, reproduzir e manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro para fins de alienação de espécimes, partes, produtos e subprodutos.
- (D) todo empreendimento autorizado pelo Ibama, de pessoa jurídica, com finalidade de: alienar animais vivos, partes, produtos e subprodutos da fauna silvestre, procedentes de criadouros comerciais autorizados pelo Ibama.
- (E) todo empreendimento autorizado pelo Ibama, somente de pessoa jurídica, com finalidade de: receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e destinar animais silvestres provenientes da ação da fiscalização, resgates ou entrega voluntária de particulares.

- 37.** Acerca da hematologia clínica de aves, é correto afirmar que
- (A) em aves, geralmente as hemácias maduras são menores do que aquelas de mamíferos e de répteis.
 - (B) as hemácias maduras de aves são globulares e arredondadas, com núcleo central elíptico.
 - (C) a contagem total de hemácias e o hematócrito de aves são influenciados por sexo, idade, efeito hormonal, hipoxia, fatores ambientais e doenças.
 - (D) dentre os leucócitos presentes no sangue de aves estão os granulócitos, classificados como neutrófilos, eosinófilos e basófilos.
 - (E) os métodos automatizados destinados à contagem de leucócitos em sangue de mamíferos fornecem também resultados precisos se empregados na contagem celular de aves.
- 38.** Sobre a interpretação da urinálise em animais silvestres, considere os seguintes itens:
- I Eritrócitos, leucócitos, células epiteliais, microrganismos, espermatozóides e cristais podem ser identificados na urina de répteis.
 - II A presença de cilindros granulosos ou hialinos na análise do sedimento urinário em aves constitui uma evidência clínico-patológica de doença renal.
 - III A evidência de cetonas na urina de aves é uma leitura verdadeira e será evidente em casos de diabetes melito.

Estão corretos os itens

- (A) I, II e III.
- (B) II e III.
- (C) I e II.
- (D) I e III.
- (E) somente I.

39. Na maior parte das espécies de aves, como uma adaptação ao voo, o forame triósseo é formado pela articulação dos seguintes ossos:

- (A) ulna, rádio e úmero.
- (B) escápulas, coracoides e clavículas.
- (C) esterno, costelas e escápulas.
- (D) supracoracoideo, propatagial e peitoral.
- (E) úmero, escápulas e costelas.

40. Sobre emergências, cuidados críticos e hospitalização de aves, mamíferos e répteis, julgue os itens:

- I Os fármacos a serem administrados em répteis são mais eficientemente absorvidos quando os pacientes apresentam baixa temperatura corpórea.
- II Durante a realização da oxigenação em aves, o posicionamento em decúbito esternal pode proporcionar melhor ventilação do que os decúbitos laterais e dorsal.
- III Durante a avaliação do animal, deve-se determinar o estado de consciência. A redução do nível de consciência implica lesão cerebral ou diminuição da perfusão cerebral.
- IV Aves com desidratação moderada (até 5%), sem sinais de choque cardiovascular, podem receber hidratação por via subcutânea.

Estão corretos os itens

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) I e III.

41. Sobre a cadeia epidemiológica de zoonoses transmitidas por animais silvestres, considere os esquemas abaixo:

Os agentes etiológicos das doenças representadas nas cadeias de I a III, respectivamente, são

- (A) I) *Toxoplasma gondii*, II) *Flavivirus* (família Flaviviridae), e III) *Leptospiraspp.*
 (B) I) *Leptospiraspp.*, II) *Rickettsia rickettsi*, e III) *Mycobacterium spp.*
 (C) I) *Toxoplasma gondii*, II) *Flavivirus* (família Flaviviridae), e III) *Hantavirus* (família Bunyaviridae).
 (D) I) *Histoplasma capsulatum*, II) *Lyssavirus* (família Rhabdoviridae) e III) *Mycobacterium spp.*
 (E) I) *Toxoplasma gondii*, II) *Hantavirus* (família Bunyaviridae), e III) *Flavivirus* (família Flaviviridae).

42. Aves podem ser acometidas por enfermidades como aspergilose, candidíase e tricomoníase. Sobre essas doenças e seus agentes etiológicos, julgue os itens:

- I Os agentes representados nas figuras causam as doenças: a) candidíase e b) aspergilose.
 II A aspergilose pode ocorrer sob diversas formas clínicas, podendo resultar no desenvolvimento de alterações neurológicas, oculares, respiratórias ou de pele.
 III A candidíase é a doença fúngica mais comum em aves.
 IV O protozoário *Trichomonas gallinae*, agente causador da tricomoníase em aves, é um dos mais significantes parasitas de rapinantes.

Estão corretos os itens

- (A) I, III e IV.
 (B) II, III e IV.
 (C) I, II, III e IV.
 (D) I, II e III.
 (E) I, II e IV.

- 43.** Sobre as técnicas de coleta de amostras biológicas em animais silvestres é correto afirmar que
- (A) durante a coleta de sangue em répteis pode ocorrer contaminação da amostra com fluido linfático, entretanto, não há interferência na interpretação dos parâmetros a serem avaliados.
 - (B) em répteis a coleta de sangue com anticoagulante citrato de sódio é a mais indicada, uma vez que permite a avaliação tanto do hemograma quanto do perfil bioquímico utilizando-se a mesma amostra.
 - (C) para exames bioquímicos dos analitos cálcio, colesterol, creatinoquinase, gama glutamiltransferase, fosfatase alcalina e ureia, o sangue poderá ser coletado com anticoagulante heparina ou até mesmo sem anticoagulante.
 - (D) para a coleta de secreções de feridas cutâneas, abscessos e exsudatos, bem como de líquidos orgânicos estéreis, não é recomendável a antisepsia do local.
 - (E) amostras de pelo para exame micológico devem ser obtidas a partir do corte dos pelos das bordas das lesões ativas.
- 44.** Sobre extrapolação alométrica é correto afirmar que
- (A) a fórmula geral para cálculo da taxa metabólica basal é expressa pela equação $TMB = K + M^{0,75}$.
 - (B) a fórmula geral para cálculo da taxa metabólica basal é expressa pela equação $TMB = K \times M^{0,75}$, onde K é uma constante imutável, utilizada para cálculos com quaisquer espécies de animais silvestres.
 - (C) a taxa metabólica específica de um animal pode ser obtida pela equação $TME = K \times M^{0,75}/M$.
 - (D) alometria é o estudo da forma em que a massa corporal varia em relação à taxa metabólica.
 - (E) a taxa metabólica específica de um animal pode ser obtida pela equação $TME = K \times M^{0,75}/M^2$.
- 45.** Sobre as deficiências nutricionais e distúrbios metabólicos em animais silvestres é correto afirmar que
- (A) em quelônios, a deficiência de vitamina A causa edema palpebral e conjuntivite, estomatites, hiperqueratose cutânea e, em casos severos, falência renal, falência hepática e morte.
 - (B) a gota úrica é um distúrbio metabólico raro em aves.
 - (C) animais cativos da ordem Squamata alimentados essencialmente com peixes congelados sofrem comumente de carência de vitamina E.
 - (D) nas serpentes, o tipo mais frequente de gota úrica é a articular.
 - (E) a deficiência de vitamina D₃ em aves causa mineralização de tecidos moles.
- 46.** Sobre a “doença do acúmulo de ferro” (DAF) em aves é correto afirmar que
- (A) se trata de uma doença de caráter agudo.
 - (B) a DAF é comumente descrita em espécies como *Ramphastos spp.* e *Pteroglossus sp.*
 - (C) os sinais clínicos são específicos e notados nos estágios iniciais da doença.
 - (D) o uso de drogas quelantes de ferro é inadequado na terapêutica da DAF.
 - (E) a flebotomia é o tratamento de primeira escolha para DAF em aves, uma vez que pode ser facilmente executado em animais de pequeno porte.
- 47.** Considerando as afirmações sobre fluidoterapia e cálculo de fluidoterapia diária, é correto afirmar que
- (A) a fluidoterapia pode ser dividida em duas categorias: emergencial e de manutenção.
 - (B) a desidratação e a hipovolemia podem ser classificadas conforme a perda hídrica em 7% (leve), 10% (moderada) e 12% (grave) do peso corporal.
 - (C) o cálculo da quantidade diária de cristalóide a ser infundida deve compreender somente o somatório dos volumes de reposição da desidratação e das perdas por diarreia e/ou vômito.
 - (D) nas provas de carga de volume indicadas na abordagem do paciente em choque, devem ser utilizados cristalóides por via subcutânea a uma taxa de 5ml/kg em um período de 1 minuto.
 - (E) a desidratação e a hipovolemia podem ser classificadas conforme a perda hídrica em 5% (leve), 7% (moderada), 10% (grave) e 12% (gravíssima) do peso corporal.

- 48.** Ainda sobre fluidoterapia e cálculo de fluidoterapia diária em aves é correto afirmar que
- (A) a necessidade hídrica para manutenção de uma ave em repouso é estimada em 20 ml/kg/dia.
 - (B) o volume de fluido relativo ao déficit pode ser calculado pela fórmula déficit de fluido (mL) = grau de desidratação (%) x peso corporal (g).
 - (C) é recomendado que 75% do déficit de fluido seja administrado nas primeiras 12 horas.
 - (D) o volume total de fluidos a ser administrado por dia deve ser dividido em duas doses.
 - (E) uma estimativa do volume de fluido necessário para corrigir o estado de desidratação pode ser calculada somente baseando-se no déficit de fluido.
- 49.** Sobre a fisiologia respiratória em aves é correto afirmar que
- (A) a troca gasosa ocorre nos sacos aéreos.
 - (B) o ar precisa de um ciclo respiratório completo para atravessar o sistema respiratório de aves.
 - (C) a troca gasosa ocorre nos parabônquios.
 - (D) a troca gasosa ocorre integralmente logo após a entrada de ar no sistema respiratório.
 - (E) o caminho inicial do ar ao entrar no sistema respiratório da ave é: traqueia, brônquios primários e sacos aéreos craniais.
- 50.** Sobre o uso dos equipamentos de contenção física em mamíferos silvestres, considere os seguintes itens:
- I Podem ser capturados com puçá animais como primatas de pequeno e médio porte, felídeos, procionídeos e canídeos.
 - II Ao fazer uso do puçá, uma vez que o animal esteja dentro do saco, já está contido adequadamente para a realização de qualquer procedimento.
 - III A maneira correta de se utilizar qualquer tipo de cambão é laçar o abdômen do animal.
- (A) I, II e III.
 - (B) II e III.
 - (C) I.
 - (D) II.
 - (E) III.

RASCUNHO