UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
EDITAL Nº 1 - COREMU/UFPA, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015

**PROCESSO SELETIVO DE
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2016
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA
PROFISSIONAL CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA
DE PEQUENOS ANIMAIS**

Medicina Veterinária

17 de janeiro de 2016

Nome do Candidato: _____

Nº de Inscrição: _____

Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde a especialidade a qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala.
2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das respostas das questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo 15 do SUS e 35 de Área Específica. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. **Esta prova terá duração de quatro horas, tendo seu início às 8:00 hs e término às 12:00 hs (horário de Belém-PA).**
4. Cada questão objetiva apresenta 5 (cinco) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E). Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 50.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, especialidade e data de nascimento, consta na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre no formulário de Correção de Dados a devida correção.
6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, duas horas após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação.
8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não será considerado.
9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão.
10. O BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA serão devolvidos ao final da sua prova. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
11. Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo de Residência Multiprofissional o candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 01/COREMU/2015 do referido processo.

Boa Prova.

FADESP

SUS

1. O trabalho dos gestores das três esferas de governo e dos outros atores envolvidos no Pacto em Defesa do SUS deve considerar como diretriz
 - (A) estabelecimento do diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS.
 - (B) promoção da cidadania como estratégia de mobilização social, tendo a questão da saúde como um direito.
 - (C) repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira, aproximando-a dos desafios atuais do SUS.
 - (D) articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como um direito.
 - (E) desenvolver e articular ações, no seu âmbito de competência e em conjunto com os demais gestores, que visem qualificar e assegurar o Sistema Único de Saúde como política pública.

2. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, institui
 - (A) são estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar, somente, para crianças e idosos.
 - (B) o impedimento de destinação de recursos públicos para auxílios nos tratamentos de portadores de doenças crônicas.
 - (C) estabelece os direitos e deveres dos usuários em relação ao atendimento nos Programas de Saúde da Família.
 - (D) esta lei regula, somente nos municípios, as ações e os serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
 - (E) as ações e os serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente seja mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

3. A regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do pacto de Gestão. Quanto aos objetivos da Regionalização pode-se afirmar que garante o(a)
 - (A) acesso somente aos serviços de saúde de média complexidade no município.
 - (B) direito à saúde, somente a nível local, que possibilite a redução das desigualdades no acesso às ações e aos serviços de saúde existentes no município.
 - (C) acesso, resolutividade e qualidade às ações e aos serviços de saúde cuja complexidade e contingente populacional transcenda a escala local/municipal.
 - (D) integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de acesso nos níveis de baixa e média complexidade do sistema.
 - (E) integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de acesso no nível de alta complexidade do sistema.

RASCUNHO

- 4.** Com relação à Regulação da Atenção à Saúde e Regulação Assistencial, pode-se afirmar que
- (A)** a Regulação da Atenção à Saúde tem como objeto a produção de todas as ações diretas e finais da atenção à saúde, dirigida aos prestadores de serviços de saúde públicos.
 - (B)** a Regulação da Atenção à Saúde tem como objeto a produção de todas as ações diretas e finais da atenção à saúde, dirigida aos prestadores de serviços de saúde privados.
 - (C)** a Regulação da Atenção à Saúde tem como objeto a produção de todas as ações diretas e finais da atenção à saúde, dirigida aos prestadores de serviços de saúde públicos e privados.
 - (D)** os complexos reguladores podem ter abrangência inframunicipal, municipal, micro ou macro regional, estadual ou nacional, devendo esta abrangência e sua respectiva gestão serem pactuadas em processo democrático e solidário entre as duas esferas de gestão do SUS.
 - (E)** os complexos reguladores podem ter abrangência inframunicipal, municipal, micro ou macro regional, estadual ou nacional, devendo esta abrangência e sua respectiva gestão serem pactuadas em processo democrático e solidário, na esfera estadual de gestão do SUS.
- 5.** Os municípios têm como responsabilidade, na Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria,
- (A)** coordenar, no âmbito nacional, a estratégia de identificação dos usuários do SUS.
 - (B)** realizar a identificação dos usuários do SUS, com vistas à vinculação de clientela e à sistematização da oferta de serviços.
 - (C)** adotar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, em consonância com os protocolos e diretrizes municipais.
 - (D)** monitorar e avaliar as ações de vigilância em saúde, realizadas nos estados, por intermédio de indicadores de desempenho, envolvendo aspectos epidemiológicos e operacionais.
 - (E)** manter atualizado o Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde no seu território, segundo normas da Secretaria de Saúde do Estado.
- 6.** Sobre as diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS, é correto afirmar que a(s)
- (A)** União é quem determina as necessidades de manutenção e expansão dos quadros de trabalhadores da saúde para os estados e municípios.
 - (B)** Secretarias de Saúdes Estaduais devem formular diretrizes de cooperação técnica para a gestão do trabalho no SUS.
 - (C)** duas esferas de gestão devem propor estudos quanto às estratégias e ao financiamento Bibartite para os trabalhadores do SUS.
 - (D)** política de recursos humanos para o SUS é um eixo estruturante e deve buscar a valorização do trabalho e dos trabalhadores da saúde, o tratamento dos conflitos e a humanização das relações de trabalho.
 - (E)** políticas de recursos humanos para a Atenção Básica de Saúde são de responsabilidade, única e exclusivamente, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS.
- 7.** Quanto à educação na saúde, é responsabilidade do município
- (A)** incentivar junto à rede de ensino, no âmbito estadual, a realização de ações educativas e de conhecimento do SUS.
 - (B)** incentivar junto à rede de ensino, no âmbito municipal, estadual e nacional, a realização de ações educativas e de conhecimento do SUS.
 - (C)** propor e pactuar, com o Sistema Federal de Educação, processos de formação de acordo com as necessidades do SUS, articulando os demais gestores na mesma direção.
 - (D)** promover a integração de todos os processos de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos à política de educação permanente, no âmbito da gestão estadual do SUS.
 - (E)** apoiar e promover a aproximação dos movimentos de educação popular na saúde na formação dos profissionais de saúde, em consonância com as necessidades sociais em saúde.

8. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, publicada no DOU de 20/09/1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. No Art. 18, estão estabelecidas as competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS entre elas
- (A) formar consórcios administrativos intermunicipais.
 - (B) formar consórcios administrativos interestaduais.
 - (C) formar consórcios administrativos intermunicipais e interestaduais.
 - (D) dar execução, no âmbito estadual, à política de insumos e equipamentos para a saúde.
 - (E) controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços municipais, estaduais e federais de saúde.
9. Está correto afirmar que
- (A) a organização da Região de Saúde deve favorecer a ação cooperativa e solidária entre os gestores e o fortalecimento do controle social.
 - (B) o Plano Diretor de Investimento – PDI, expressa os recursos de investimentos para atender às necessidades pactuadas no planejamento nacional.
 - (C) o Plano Diretor de Regionalização – PDR, expressa o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em suas diferentes formas, em cada município.
 - (D) entre as premissas da descentralização, podemos dizer que, a Comissão Intergestores Bipartite e o Ministério da Saúde promoverão a apoiarão o processo de qualificação permanente para as Comissões Intergestores Tripartite.
 - (E) os principais instrumentos de planejamento da regionalização são o Plano Diretor de Regionalização – PDR, o Plano Diretor de Investimento – PDI, a Programação Pactuada e Integrada da Atenção à Saúde – PPI, o Piso de Atenção Básica – PAB e o Piso de Atenção Básica Variável – PAB Variável.
10. Entre os objetivos do fortalecimento da Atenção Básica está
- (A) garantir o financiamento da atenção básica como responsabilidade das duas esferas de gestão do SUS.
 - (B) ampliar a estratégia de Saúde da Família, e os serviços de média e alta complexidade nos grandes centros urbanos.
 - (C) garantir o financiamento da atenção básica como responsabilidade das três esferas de gestão do SUS.
 - (D) consolidar e qualificar a estratégia de Saúde da Família, somente, nos pequenos municípios.
 - (E) implantar o processo de monitoramento e avaliação da atenção básica nas duas esferas de governo, com vistas à qualificação da gestão descentralizada.
11. A lei 8080/90, no Art. 13, determina a articulação das políticas e dos programas, a cargos das comissões intersetoriais, abrangendo, em especial, as seguintes atividades:
- (A) alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; vigilância sanitária e farmacoepidemiológica; recursos humanos; ciência e tecnologia e saúde do trabalhador.
 - (B) alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; vigilância sanitária e farmacoepidemiológica; recursos humanos; ciência e tecnologia; saúde do trabalhador e saúde indígena.
 - (C) alimentação e nutrição; vigilância sanitária e farmacoepidemiológica; recursos humanos; ciência e tecnologia; saúde do trabalhador e saúde indígena.
 - (D) alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; vigilância sanitária e farmacoepidemiológica; ciência e tecnologia; saúde do trabalhador e saúde indígena.
 - (E) alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; vigilância epidemiológica; ciência e tecnologia; saúde do trabalhador e saúde indígena.

RASCUNHO

- 12.** A lei 8142/90 refere em seu Art. 2º que os recursos do Fundo Nacional de Saúde – FNS serão alocados como
- (A) cobertura das ações e dos serviços de saúde a serem implementados pela União.
 - (B) investimentos previstos no Plano Quinquenal dos Ministérios da Saúde e da Educação.
 - (C) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional.
 - (D) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
 - (E) despesas de custeio e de capital dos Ministérios da Saúde e da Educação, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- 13.** Em relação à direção e articulação do SUS, é correto afirmar que a(o)
- (A) direção do SUS, em cada esfera de governo, é composta pelo órgão setorial do poder executivo e pelo respectivo Conselho de Saúde, nos termos das Leis Nº 8.080/90 e Nº 8.112/1990.
 - (B) definição sobre o número de membros de cada CIT deve considerar as diferentes situações de cada estado, como número de municípios, número de regiões de saúde, buscando a maior representatividade possível.
 - (C) processo de articulação entre os gestores, nos diferentes níveis do sistema, ocorre, preferencialmente, em dois colegiados de negociação: a Comissão Intergestores Tripartite - CIT e a Comissão Intergestores Bipartite - CIB, que pactuarão sobre a organização, direção e gestão da saúde.
 - (D) CIB é composta, paritariamente, por representação do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde CONASS e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde CONASEMS, sendo um espaço tripartite para a elaboração de propostas para a implantação e operacionalização do SUS.
 - (E) CIT, composta igualmente de forma paritária e integrada por representação da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde COSEMS ou órgão equivalente, é a instância privilegiada de negociação e decisão quanto aos aspectos operacionais do SUS.
- 14.** O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Entre as suas prioridades, foi pactuada a Promoção da Saúde, que tem como um dos seus objetivos elaborar e implementar uma política de promoção da saúde, de responsabilidade do(s) gestor(es)
- (A) municipal.
 - (B) municipal estadual e federal.
 - (C) municipal e estadual.
 - (D) estadual e federal.
 - (E) municipal e federal.
- 15.** A Participação Social no SUS é um princípio doutrinário assegurado na Constituição e nas Leis Orgânicas da Saúde (8080/90 e 8142/90) e é parte fundamental do Pacto pela Vida. Uma das ações que deve ser desenvolvida para fortalecer o processo de participação social é
- (A) apoiar o processo de formação dos conselheiros.
 - (B) apoiar o processo de formação dos conselheiros e dos secretários municipais e estaduais de saúde.
 - (C) estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde, educação e segurança nos municípios.
 - (D) apoiar os processos de educação popular e permanente na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
 - (E) apoiar os conselhos de saúde, as conferências de saúde e os movimentos sociais que atuam no campo da saúde e educação.

ÁREA ESPECÍFICA

- 16.** Com relação aos fios de sutura, pode-se afirmar que
- (A) o fio de nylon é norgânico inabsorvível e possui boa resistência, embora os nós sejam pouco seguros.
 - (B) o fio de catgut é orgânico absorvível e não pode ser utilizado em suturas da bexiga.
 - (C) o fio de polidoxona 910 é sintético inabsorvível e possui boa resistência, sendo indicado para suturas de órgãos ocos, como intestino.
 - (D) as alternativas A, B e C estão corretas.
 - (E) todas as alternativas anteriores são incorretas.
- 17.** Com relação à patogenia da piometra em cadelas, pode-se afirmar que
- (A) os estrógenos exógenos favorecem a imunidade uterina.
 - (B) cadelas que nunca cruzaram têm maior possibilidade de desenvolver a doença.
 - (C) progestágenos exógenos favorecem a ocorrência da doença, uma vez que estimulam as glândulas endometriais a produzir maior quantidade de muco no diestro.
 - (D) a progesterona exógena, quando utilizada em intervalos regulares, melhora a qualidade das secreções uterinas e diminui a ocorrência da doença.
 - (E) todas as alternativas anteriores estão incorretas.
- 18.** Com relação à hérnia diafragmática traumática, pode-se afirmar que
- (A) a patogenia está relacionada ao aumento súbito do gradiente de pressão entre o tórax e o abdome
 - (B) a dispnéia ocorre exclusivamente em função da dor que o animal apresenta.
 - (C) o prognóstico é sempre o mesmo, independentemente da víscera herniada.
 - (D) o exame radiográfico não gera dados importantes para o diagnóstico, devendo este ser apenas clínico/ambulatorial.
 - (E) todas as alternativas anteriores estão incorretas.
- 19.** Com relação à uretostomia em cães, pode-se afirmar que
- (A) a uretra deve ser suturada com pontos em U deitado para diminuir a hemorragia.
 - (B) o local ideal para o procedimento é a uretra peniana, em função da localização mais frequente dos cálculos uretrais nesta região.
 - (C) a sutura de Cushing é a melhor escolha para a sutura da uretra.
 - (D) o local ideal para a realização do procedimento é a uretra escrotal, devendo o cão ser castrado durante o procedimento.
 - (E) todas as alternativas anteriores são corretas.
- 20.** Com relação à uretrotomia em cães, podemos afirmar que
- (A) a uretrotomia deve ser escrotal em função do maior calibre do órgão neste local.
 - (B) a uretra deve ser suturada com pontos em U deitado para diminuir a hemorragia.
 - (C) o local mais provável para obstrução por cálculos é imediatamente caudal ao osso peniano.
 - (D) sangramentos no pós-cirúrgico são indicativos de ruptura da síntese e devem ser observados.
 - (E) todas as alternativas anteriores estão incorretas.
- 21.** As indicações para cistotomia em caninos são
- (A) cálculos vesicais, cálculos uretrais (retropropulsão), neoplasias intraluminais e biopsias.
 - (B) cálculos vesicais, cálculos uretrais (retropropulsão), cálculos renais (propulsão), neoplasias intraluminais e biopsias.
 - (C) cálculos vesicais, cálculos renais (propulsão), neoplasias intraluminais e biopsias.
 - (D) cálculos vesicais, neoplasias intraluminais e biopsias.
 - (E) todas as alternativas anteriores são corretas.

- 22.** Em casos de diagnóstico de fetos autolíticos em uma fêmea canina, a técnica cirúrgica de escolha é a
- (A) cesariana com sutura em dupla camada de cusching.
 - (B) ovariossalpingohisterectomia.
 - (C) cesariana com sutura em uma camada festonada e uma camada de cusching.
 - (D) todas as alternativas estão erradas.
 - (E) as alternativas A, B e C são corretas.
- 23.** A cesariana em cadelas é um procedimento relativamente comum, assim, onde deve ser realizada a incisão deste órgão?
- (A) No corno uterino direito.
 - (B) No corno uterino esquerdo.
 - (C) No corpo do útero.
 - (D) Uma incisão no corno esquerdo e uma no direito.
 - (E) Todas as alternativas anteriores são corretas.
- 24.** Com relação à cesariana em pequenos animais, pode-se afirmar que
- (A) as suturas de arrimo devem ser colocadas antes da incisura do útero.
 - (B) a sutura de cusching em dupla camada com fio sintético absorvível confere boa segurança à linha de sutura.
 - (C) as incisões nos cornos uterinos facilitam a remoção dos filhotes.
 - (D) somente utiliza-se a incisão no corpo do útero em caso de ninhadas pequenas.
 - (E) todas as alternativas anteriores são corretas.
- 25.** Com relação à ovariohisterectomia em bloco, pode-se afirmar que
- (A) trata-se apenas da ovariohisterectomia realizada em bloco cirúrgico, sendo portanto mais segura para o paciente.
 - (B) não deve ser realizada, pois leva ao aumento da pressão arterial da fêmea.
 - (C) quando realizada, utilizar cetamina na anestesia, para manter a pressão arterial.
 - (D) o útero deve ser removido o mais rapidamente possível, após o pinçamento do pedículo ovariano.
 - (E) todas as alternativas anteriores estão incorretas.
- 26.** Durante a mastectomia, há vasos sanguíneos que devem ser ligados, sendo os mais importantes
- (A) artérias e veias pudendas internas e externas.
 - (B) artérias e veias epigástricas superficiais caudais e craniais.
 - (C) artérias e veias mamárias.
 - (D) as alternativas A, B e C estão corretas.
 - (E) todas as alternativas estão erradas.
- 27.** Com relação às mucocèles em cães, pode-se afirmar que
- (A) a punção do conteúdo pode ajudar no diagnóstico.
 - (B) a injeção de agentes cáusticos é o método mais indicado para a resolução do problema.
 - (C) colocar o paciente em decúbito ventral ajuda a identificar o lado afetado.
 - (D) pacientes com mucocèle geralmente apresentam dor à palpação durante o exame clínico.
 - (E) todas as alternativas anteriores estão incorretas.
- 28.** Na técnica de colopexia, realiza-se uma incisão no intestino
- (A) sero-muscular, longitudinal, de aproximadamente 10 cm na borda mesentérica.
 - (B) sero-mucosa, longitudinal, de aproximadamente 10 cm da borda mesentérica.
 - (C) sero-muscular, longitudinal, de aproximadamente 5 cm, na borda anti-mesentérica.
 - (D) sero-mucosa, longitudinal, de aproximadamente 5 cm na borda mesentérica.
 - (E) todas as alternativas anteriores estão incorretas.

- 29.** Com relação ao pós-operatório da gastrotomia, pode-se afirmar que
- (A) a alimentação deve ser liberada após 8 horas do procedimento.
 - (B) o paciente deve ficar em soroterapia por 24 horas e sem ingestão de qualquer natureza durante este período.
 - (C) desde que seja feita omentalização, não há necessidade de jejum no pós-operatório.
 - (D) o paciente deve ficar em soroterapia por 72 horas e sem ingestão de qualquer natureza durante este período.
 - (E) todas as alternativas anteriores estão incorretas.
- 30.** Com relação à enterectomia, pode-se afirmar que o(a)
- (A) e teste de vedação deve ser realizado após a colocação de cada sutura.
 - (B) melhor fio para sutura é o algodão trançado, por ser facilmente manipulado.
 - (C) incisão angulada em 45° da alça com menor diâmetro melhora o resultado da anastomose término-terminal.
 - (D) incisão angulada em 45° da alça com menor diâmetro melhora o resultado da anastomose término-terminal.
 - (E) todas as alternativas anteriores estão incorretas.
- 31.** Com relação à epidemiologia da hérnia perineal em cães, pode-se afirmar que
- (A) ocorrem mais frequentemente em cadelas inteiras e idosas.
 - (B) ocorrem mais frequentemente em cães machos idosos e não castrados.
 - (C) ocorrem mais frequentemente em cadelas jovens inteiras.
 - (D) ocorrem mais frequentemente em cães machos idosos e castrados.
 - (E) todas as alternativas anteriores estão incorretas.
- 32.** Com relação à hérnia perineal em cães, pode-se afirmar que
- (A) as cadelas estão mais predispostas que os cães.
 - (B) o índice de sucesso cirúrgico é alto.
 - (C) a retroflexão da bexiga caracteriza um agravamento do quadro geral do paciente.
 - (D) a punção pode auxiliar no diagnóstico.
 - (E) todas as alternativas anteriores estão corretas.
- 33.** As hérnias inguinais são mais frequentes em
- (A) machos, idosos, da raça Yorkshire.
 - (B) machos, idosos, da raça Tekel.
 - (C) fêmeas, idosos, da raça Tekel.
 - (D) fêmeas, idosos, da raça Yorkshire.
 - (E) todas as alternativas anteriores estão incorretas.
- 34.** Com relação aos neoplasmas de mama, pode-se afirmar que a(as)
- (A) hiperplasia fibro-epitelial normalmente ocorre pelo uso de progestágenos nas gatas.
 - (B) fêmeas múltiparas têm menor possibilidade de desenvolver tumores de mama.
 - (C) fêmeas que nunca lactaram têm maior predisposição a apresentar tumores.
 - (D) castração previne o aparecimento dos tumores, entretanto não deve ser realizada antes do primeiro cio.
 - (E) todas as alternativas anteriores estão incorretas.

RASCUNHO

- 35.** Sobre a endocardiose é correto afirmar que
- I A endocardiose é uma doença degenerativa do músculo cardíaco, onde há dilatação acentuada dos átrios. Acomete principalmente animais idosos.
 - II Em todos os casos, observamos os sinais clínicos clássicos de insuficiência cardíaca congestiva esquerda, como tosse, edema pulmonar, falta de ar, cianose e cansaço fácil.
 - III O tratamento se baseia na presença e gravidade dos sinais clínicos e consiste basicamente em glicosídeos cardíacos, como a digoxina, para aumentar a força de ejeção.
- (A) todas as afirmações estão corretas.
 - (B) as afirmações corretas são I e II.
 - (C) as afirmações corretas são II e III.
 - (D) somente a afirmação III é correta.
 - (E) nenhuma das alternativas é correta.
- 36.** Sobre as doenças cardíacas, pode-se afirmar que
- (A) na persistência do ducto arterioso, a principal consequência é a sobrecarga do ventrículo esquerdo, causando dilatação e hipertrofia ventricular esquerda.
 - (B) na estenose da válvula pulmonar há hipertrofia ventricular direita e dilatação secundária. A turbulência pós-estenótica causa a dilatação da artéria pulmonar.
 - (C) na persistência do arco aórtico direito existe uma persistência do anel vascular, que impede a passagem normal do alimento pelo esôfago, levando a um quadro de regurgitação e provável pneumonia por aspiração secundária.
 - (D) na cardiomiopatia dilatada, a presença de arritmias pode ser secundária à dilatação cardíaca e perfusão coronariana comprometida, levando à isquemia cardíaca.
 - (E) todas as alternativas estão corretas.
- 37.** Sobre o complexo respiratório viral felino, pode-se afirmar que
- (A) os principais agentes etiológicos são vírus da rinotraqueíte felina, herpesvírus e calicivirose felina.
 - (B) adultos de 2-4 anos são os mais predispostos.
 - (C) tosse produtiva é o principal sinal clínico observado.
 - (D) o vírus da rinotraqueíte está relacionado à presença de úlceras orais.
 - (E) gatos que já tiveram contato com os vírus nos primeiros meses de vida não vão apresentar sinais da doença na vida adulta.
- 38.** Sobre o colapso de traqueia em cães, pode-se afirmar que
- (A) o diagnóstico pode ser feito através de radiografias: na inspiração, quando se suspeita de colapso na porção da traqueia intra-torácico, e na expiração, quando se suspeita de colapso da traqueia cervical.
 - (B) a média de idade dos animais afetados é de 2 anos.
 - (C) o principal sinal clínico é tosse improdutiva.
 - (D) o Labrador é uma raça frequentemente afetada.
 - (E) todas as alternativas estão corretas.
- 39.** Sobre cistite aguda em cães, pode-se afirmar que
- (A) polaquiúria, anúria e hematúria são os principais sinais clínicos observados.
 - (B) os principais achados da urinálise são: piúria, hematúria, proteinúria (exudação inflamatória), bacteriúria e células epiteliais de transição.
 - (C) o tratamento se baseia no uso de anti-inflamatórios, de preferência não esteroidais, pois apresentam uma melhor ação no epitélio da bexiga.
 - (D) as complicações da cistite aguda podem ser formação de cálculos de estruvita e glomerulonefrite, no caso de ascensão das bactérias no trato urinário.
 - (E) todas as alternativas estão corretas.

- 40.** Sobre urolitíases, pode-se afirmar que
- (A) podem se localizar nos ureteres, na bexiga ou nos rins.
 - (B) hematúria, polaquiúria, disúria e obstrução uretral com uremia são os principais achados clínicos.
 - (C) o diagnóstico pode ser feito pelos sinais clínicos, exames físicos e exames complementares, como radiografias simples e contratadas, além da ultrassonografia.
 - (D) a hidropropulsão é uma manobra que pode ser utilizada quando o cálculo está na uretra.
 - (E) todas as alternativas estão corretas.
- 41.** Sobre os urólitos de estruvita em cães, pode-se afirmar que
- (A) é o tipo de urólito mais comum em cães, principalmente em cadelas.
 - (B) a sua formação ocorre em urina de pH alcalino.
 - (C) em alguns casos pode estar relacionado com a presença de bactérias produtoras de urease.
 - (D) os cálculos de estruvita podem ser dissolvidos com o tratamento adequado.
 - (E) todas as alternativas estão corretas.
- 42.** Sobre as dermatites alérgicas, pode-se afirmar que
- I a dermatite atópica é provocada pela produção de imunoglobulinas específicas a alérgenos ambientais, com liberação de compostos farmacologicamente ativos, como histamina, serotonina e leucotrienos, e o tratamento se baseia principalmente no controle da população bacteriana na epiderme.
 - II a dermatite alérgica à picada de pulga é causada pela grande infestação de pulgas em um animal. Pode acometer cães e gatos.
 - III a alergia alimentar é devido à ingestão do alérgeno durante a alimentação. O alérgeno é comumente uma glicoproteína presente no alimento.
- (A) todas as afirmações estão corretas.
 - (B) as afirmações corretas são I e II.
 - (C) as afirmações são II e III.
 - (D) somente a afirmação III é correta.
 - (E) nenhuma das alternativas é correta.
- 43.** Sobre as dermatites parasitárias, pode-se afirmar que
- I a demodicose é causada pelo ácaro *Demodex canis*. Ela pode ser localizada ou generalizada. O prurido é o principal sinal clínico desta afecção.
 - II a *Sarcoptes canis* é o ácaro causador da escabiose. É um tipo de sarna transmissível de um animal para outro com contato. Seu tratamento pode ser realizado com ivermectina.
 - III o *Notoedres cati* é um ácaro que se localiza preferencialmente no pavilhão auricular, podendo causar otite.
- (A) todas as afirmações estão corretas.
 - (B) as afirmações corretas são I e II.
 - (C) as afirmações são II e III.
 - (D) somente a afirmação III é correta.
 - (E) nenhuma das alternativas é correta.
- 44.** Sobre a lipidose hepática felina, pode-se afirmar que
- I é causada pelo acúmulo de carboidratos no fígado.
 - II o tratamento é baseado no jejum alimentar do animal até que todo carboidrato acumulado seja metabolizado.
 - III a etiologia da lipidose felina é idiopática, mas está relacionada com fatores estressantes.
- (A) todas as afirmações estão corretas.
 - (B) as afirmações corretas são I e II.
 - (C) as afirmações corretas são II e III.
 - (D) somente a afirmação III é correta.
 - (E) nenhuma das alternativas é correta.

- 45.** Sobre as doenças do esôfago, pode-se afirmar que
- (A) o principal sinal clínico do megaesôfago é o vômito, que pode ser aspirado pelo animal e causar uma pneumonia aspirativa.
 - (B) o diagnóstico definitivo do megaesôfago é feito através de radiografias simples e contrastadas, ultrassonografia, além de histórico e sinais clínicos.
 - (C) o megaesôfago pode ter origem congênita ou adquirida (muscular, nervosa ou obstrutiva). Seu tratamento se baseia no manejo do animal, que deve comer com o pescoço elevado uma comida mais pastosa.
 - (D) a esofagite pode ser causada por vômitos persistentes e seu tratamento deve ser feito com antibióticos e anti-inflamatórios.
 - (E) todas as alternativas estão corretas.
- 46.** Sobre a icterícia, pode-se afirmar que a
- (A) icterícia pré-hepática é decorrente de hemólise.
 - (B) icterícia hepática é devido à doença/insuficiência hepática.
 - (C) icterícia pós hepática pode ser causada por obstruções dos ductos biliares.
 - (D) bilirrubina não conjugada é também chamada de direta.
 - (E) todas as alternativas estão corretas.
- 47.** Em relação à insuficiência hepática, pode-se afirmar que a
- (A) a diminuição da produção hepática dos fatores de coagulação pode ser uma causa de hemorragia.
 - (B) encefalopatia hepática está relacionada com o acúmulo de ureia na corrente sanguínea.
 - (C) ascite pode ser decorrente de ICCD, quando o fígado está afetado gravemente na insuficiência hepática.
 - (D) hiperglicemia é um achado comum.
 - (E) todas as alternativas são corretas.
- 48.** Sobre o diabetes melito, pode-se afirmar que
- I a hiperglicemia pode ser devido à exposição prolongada a fatores de resistência à insulina, como obesidade, progestágenos, diestro, infecções ou corticóides.
 - II os principais sinais clínicos são poliúria, polidipsia e perda de peso.
 - III a dosagem de hemoglobina sérica glicosilada e frutossamina sérica pode ser utilizada para avaliação de hiperglicemia por tempo retroativo de algumas semanas. São úteis principalmente para avaliação de felinos.
- (A) todas as afirmações estão corretas.
 - (B) as afirmações corretas são I e II.
 - (C) as afirmações corretas são II e III.
 - (D) somente a afirmação III é correta.
 - (E) nenhuma das alternativas é correta.
- 49.** Sobre o hiperadrenocorticism (HAC), pode-se afirmar que o(a)
- (A) HAC hipófise-dependente é caracterizado pela secreção exagerada de TSH pela hipófise.
 - (B) HAC adrenal-dependente é caracterizada pela presença de neoplasias adrenocortical secretoras de cortisol.
 - (C) dosagem de ALT e FA está diminuída em 90% dos casos de HAC.
 - (D) diagnóstico de HAC é realizado pelo teste de supressão com dose alta de dexametasona.
 - (E) todas as alternativas estão corretas.

RASCUNHO

50. Na doença glomerular, pode-se afirmar que

- I a síndrome nefrótica é uma complicação grave da glomerulonefrite, onde há severa perda de proteína pela urina.
- II erlichiose e piometra podem casar glomerulonefrite por deposição de imunocomplexos.
- III amiloidose renal é outra causa de doença glomerular.

- (A) todas as afirmações estão corretas.
- (B) as afirmações corretas são I e II.
- (C) as afirmações corretas são II e III.
- (D) somente a afirmação III é correta.
- (E) todas as alternativas estão incorretas.

RASCUNHO